BRAVECTO®

Der 12 Wochen*-Parasitenschutz für Ihre Katze

Produktinformationen von Ihrem Tierarzt

MEHR. WERT. PRÄVENTION.

MSD Tiergesundheit

FAKTEN ZUR ZECKE



Häufigste Zeckenarten in Deutschland & Österreich:

Gemeiner Holzbock (*I. ricinus*)

Wiesenzecke (*D. reticulatus*)

Tierbesitzer haben ein **1,5-fach höheres Risiko** für einen Zeckenstich als Menschen ohne Tier.

In Europa sind bis zu **75 %** der *I. ricinus*-Zecken mit Borrelien infiziert.[1]

Zeckenstiche und nicht sachgerecht entfernte Zecken können **entzündliche Reaktionen** auslösen.

Mögliche **Folgen** von Zeckenstichen:
- Übertragung von Krankheitserregern
- Anämie (Blutarmut)

FAKTEN ZUM FLOH

Nur **5 %** sind sichtbar! **95 % leben „unbemerkt“** bei Ihnen Zuhause (z. B. unter Teppichen, in der Bettwäsche oder im Körbchen Ihres Tiers).

Der Floh dient als Zwischenwirt von Bandwürmern, z. B. **Gurkenkernbandwurm.**

Die häufigsten Symptome eines Flohbefalls: **Juckreiz und Haarausfall.**

Flöhe können unter anderem den **Krankheitserreger** der Katzenkratzkrankheit (Bartonellose) übertragen.

Achtung, wenn Ihre Katze **allergisch auf den Flohspeichel** (Flohallergiedermatitis, FAD) reagiert! Das zeigt sich u. a. durch starken Juckreiz, eitrige Hautentzündungen oder Haarausfall.



Weitere Parasiten, die bei der Katze vorkommen können, sind:

Ohrmilben (*Otodectes cynotis*)
Ohrmilben sind ansteckend und äußern sich durch bräunliche Ablagerungen im Ohr sowie durch heftiges Kopfschütteln, Kratzen am/im Ohr, Entzündungen und Schmerzen im Ohrbereich.

WARUM BRAUCHT ES EINEN LÜCKENLOSEN & GANZJÄHRIGEN SCHUTZ?

Die zunehmenden klimatischen Veränderungen begünstigen das Vorkommen und eine stärkere Verbreitung von **Zecken.**

Haben sich **Flöhe** einmal bei Ihnen Zuhause eingenistet, sind sie nur schwer wieder loszuwerden.



Adaptiert nach L. Chitimia-Dobler, G. Dobler, Nationales Konsiliarlabor für FSME Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr München, Vortrag „Zecken", Pressekonferenz MSD Tiergesundheit, Bielefeld, 2019.

Die ESCCAP[#] empfiehlt:

„In Gebieten, in denen infizierte Zecken vorkommen, besteht das Risiko, dass Tiere sich mit Erregern zeckenübertragener Erkrankungen anstecken. Daher werden kontinuierliche Behandlungen mit dem Ziel einer konstanten Schutzwirkung empfohlen."[2]

„Eine sachgerechte Flohbekämpfung hat zum Ziel, einen Flohbefall bei Haustieren zu verhindern. (...) Ist die Wahrscheinlichkeit für eine Reinfestation hoch, empfiehlt sich eine regelmäßige, eventuell ganzjährige Prophylaxe durch Anwendung geeigneter Tierarzneimittel. Auch wenn der Flohbefall im Sommer und Herbst am häufigsten auftritt, haben Studien gezeigt, dass eine Infestation mit Flöhen in jeder Jahreszeit möglich ist."[2]

Ein lückenloser & ganzjähriger Schutz vor Zecken und Flöhen ist ratsam.

Die European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) stellt regelmäßig aktualisierte, fundierte Informationen zur Verfügung, die helfen, Hunde und Katzen – aber auch Menschen – vor einem Befall mit Parasiten und dessen Folgen zu schützen.

BRAVECTO® SPOT-ON: SOFORTIGE UND ANHALTENDE WIRKUNG*

Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls
Wirkeintritt bei Flöhen (*C. felis*) innerhalb von 12 Stunden,
bei Zecken (*I. ricinus*) innerhalb von 48 Stunden. Wirkt 12 Wochen* lang.

Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (*Otodectes cynotis*)

Anwendbar bei Katzenwelpen ab 9 Wochen und ab 1,2 kg Körpergewicht

Katzen mit Flohallergiedermatitis (FAD)

VERWENDEN SIE BRAVECTO® GEMÄSS DER GEWICHTSKLASSE IHRER KATZE

Die Gewichtsklasse M ist auch als 2er-Packung erhältlich

BRAVECTO® Spot-on

Weitere Informationen, auch zur Anwendung, finden Sie in der Gebrauchsinformation.

BRAVECTO® SPOT-ON: PRAKTISCHE ANWENDUNG

1

Hygienehinweis:
Da das Produkt haftet, tragen Sie bitte Handschuhe bei der Applikation.

2

Achten Sie darauf, die Pipette aufrecht an einer stabilen Stelle zu halten. Zum Öffnen drehen Sie die Kappe, ohne sie von der Pipette zu lösen.



3

Stellen Sie sicher, dass der Rücken der Katze gerade ist. Teilen Sie das Katzenhaar an der Applikationsstelle an der Schädelbasis.

4

Den kompletten Inhalt des Spot-ons direkt auf die Haut auftragen. Bei Katzen ab 6,25 kg an zwei Stellen an der Schädelbasis auftragen.

Unser Erinnerungsservice unterstützt Sie dabei, an den nächsten Parasitenschutz zu denken:
www.bravecto.de/erinnerungsservice

INFORMATIONEN VON IHRER TIERARZTPRAXIS

Überreicht durch:

Für weitere Informationen zu verschiedenen Katzenthemen: **www.lieblingstier.info**

15495-DE-März2022(5000) DE-BRV-220200007

Referenzen: 1. Rauter C, Hartung T. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato genospecies in Ixodes ricinus ticks in Europe: a meta-analysis. Appl Environ Microbiol. 2005;71(11):7203–16. **2.** https://www.esccap.de/tieraerzte/empfehlungen/ektoparasiten

*** Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen:** sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (*Otodectes cynotis*). **Bravecto® Plus Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen:** sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (*Otodectes cynotis*). Zur Behandlung von Infektionen mit Spulwürmern (*Toxocara cati*) und Hakenwürmern (*Ancylostoma tubaeforme*). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel kontinuierlich einer durch *Dirofilaria immitis* verursachten Herzwurmerkrankung vor.

Bravecto® 112,5/250/500 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine/mittelgroße/große Katzen. **Wirkstoff:** Fluralaner. **Wirkstoffgruppe:** Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. **Zusammensetzung:** Jeder ml enthält 280 mg Fluralaner. Eine Pipette ergibt: 112,5/250/500 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (*Otodectes cynotis*). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen, Juckreiz oder Haarausfall an der Applikationsstelle wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (2,2 % der behandelten Katzen). Folgende weitere Symptome wurden kurz nach der Verabreichung gelegentlich beobachtet: Teilnahmslosigkeit/Tremor/Appetitlosigkeit (0,9 % der behandelten Katzen) oder Erbrechen/Speicheln (0,4 % der behandelten Katzen). Sehr selten wurden Krämpfe in Berichten zur Verträglichkeit nach der Markteinführung gemeldet (Pharmakovigilanz). **Warnhinweise:** Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. **Handelsformen:** Schachtel mit 1 oder 2 Pipetten (nur 250 mg) und ein Paar Handschuhe pro Pipette. **DE: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer:** Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de. **AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria-Codex-Fachinformation" zu entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer:** Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, A-1210 Wien. www.msd-tiergesundheit.at.

Urheberrechtlich geschützt © 2022 Intervet International B.V., ein Tochterunternehmen der Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit
Intervet Deutschland GmbH I Feldstraße 1a I D-85716 Unterschleißheim I **www.msd-tiergesundheit.de**
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | **www.msd-tiergesundheit.at**

MSD Tiergesundheit