



# **BRAVECTO®**

## **Die 12-Wochen-Kautablette\* gegen Zecken und Flöhe**

### **Einfach – Schnell – Langanhaltende Wirkung**

#### **Wofür braucht mein Hund Bravecto®?**

Bravecto® enthält einen, speziell für die Tiermedizin neu entwickelten Wirkstoff gegen Zecken und Flöhe, der erstmalig in einer praktischen Kautablette für den Hund erhältlich ist. Bravecto® befreit Ihren Hund gründlich von den genannten Parasiten und schützt bis zu 12 Wochen\* wirkungsvoll vor Neubefall.

#### **Wie verabreiche ich meinem Hund Bravecto®?**

Die Kautablette ähnelt einem Hundekuchen und schmeckt Ihrem Hund. Sie können die praktische Tablette daher sowohl direkt verabreichen als auch problemlos unter das Futter mischen. Aufgrund der kindersicheren Verpackung von Bravecto®, benötigen Sie ggf. eine Schere zum Öffnen.

#### **Was muss ich bei der Gabe von Bravecto® beachten?**

Die Wirkstoffmenge in der Kautablette ist auf die Gewichtsklasse Ihres Hundes abgestimmt. Daher sollte die Kautablette nicht geteilt werden, da die vollständige Wirkung sonst nicht gewährleistet werden kann.

#### **Wie oft sollte ich meinem Hund Bravecto® geben?**

Zecken und Flöhe können das ganze Jahr über auftreten. Zur optimalen Kontrolle eines Flohbefalls sollte Bravecto® bei den heimischen Zecken „Gemeiner Holzbock“ und „Auwaldzecke“ in Abständen von 12 Wochen verabreicht werden. Bei der, in südlichen Ländern vorkommenden, „Braunen Hundezecke“ liegt das Behandlungsintervall bei 8 Wochen.

#### **Ist Bravecto® für alle Hunde geeignet?**

Bravecto® eignet sich für alle Hunderassen. Das Präparat kann außerdem unbedenklich angewendet werden bei:

- Hundewelpen ab 8 Wochen und ab 2 kg
- Trächtigen und säugenden Hündinnen
- Zuchthunden
- Hunden mit Flohallergiedermatitis
- Hunden mit MDR1-Defekt



**MSD**

Tiergesundheit

## Gibt es Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln?

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

## Muss ich weitere Maßnahmen, zusätzlich zur Behandlung mit Bravecto®, bei Floh- und Zeckenbefall durchführen?

Bei Flohbefall in der Wohnung ist es ratsam, Fußböden und Teppiche gründlich abzusaugen. Reinigen Sie außerdem den Schlafplatz Ihres Tieres sorgfältig. Waschen Sie dazu Kissen und Decken bei mindestens 40–60 Grad Celsius. Falls Sie Ihr Tier in Ihrem Auto transportieren, denken Sie daran, auch die Liegefläche und ggf. die Autositze zu reinigen. Durch diese Maßnahmen verhindern Sie, dass sich aus den Vorstadien der Flöhe weitere Flöhe in der Umgebung entwickeln können.

Zecken sterben durch Bravecto® ebenfalls nach kurzer Zeit ab. Auf diese Weise wird das Risiko der Übertragung gefährlicher Krankheiten minimiert. Eine effektive Bravecto®-Behandlung ist daher ein optimaler Schutz für Sie und Ihr Tier.

## Muss ich etwas beachten beim Umgang mit dem Hund?

Durch die Gabe von Bravecto® ändert sich im Umgang mit Ihrem Vierbeiner rein gar nichts. Bravecto® wird nicht äußerlich angewendet, somit können äußere Einflüsse, wie Wasser und Sonne, die Wirkung nicht beeinträchtigen. Sie können Ihren Hund wie gewohnt baden und bürsten. Da das Fell des Tieres nicht mit dem Wirkstoff in Kontakt kommt, können selbst Kinder und Allergiker Ihrem vierbeinigen Liebling uneingeschränkt Streicheleinheiten zukommen lassen.



\*Gemäß Fachinformation; sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* und *D. variabilis* über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen *Rhipicephalus sanguineus* über 8 Wochen.

**Bravecto® 112,5/250/500/1000 /1400 mg Kautabletten** für sehr kleine /kleine /mittelgroße /große /sehr große Hunde. **Wirkstoff:** Fluralaner. **Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält: 112,5/250/500 /1000/1400 mg Fluralaner. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* und *D. variabilis* über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen *Rhipicephalus sanguineus* über 8 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Die Wirkung beginnt bei Flöhen (*C. felis*) innerhalb von 8 Stunden, bei Zecken (*I. ricinus*) innerhalb von 12 Stunden nach Anhaftung. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** In klinischen Studien häufig beobachtete Nebenwirkungen (bei 1,6% der behandelten Hunde) waren milde und vorübergehende gastrointestinale Effekte wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter Speichelfluss. **Handelsformen:** Faltschachtel mit 1 Kautablette im Blister. **Verschreibungspflichtig.** **Pharmazeutischer Unternehmer:** Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim.

überreicht durch:

Stempel / Datum / Unterschrift

Die Wissenschaft für gesündere Tiere™

Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit

Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | [www.msd-tiergesundheit.de](http://www.msd-tiergesundheit.de)

 **MSD**  
Tiergesundheit