

BRAVECTO®

TIERARZT
EXKLUSIV




12 00 00
WOCHEN TAGE STUNDEN

Frei vom Floh durch Bravecto®

Schnelle, langanhaltende, abtötende Wirkung gegen
Flöhe und auch heimische Zecken über 12 Wochen*

► Problem



► Lösung

- Kautablette mit sehr guter Akzeptanz
- Neuer Wirkstoff: Fluralaner
- Leichte Handhabung durch orale Applikation
- FAD (Teil der Behandlungsstrategie gegen allergische Flohdermatitis)
- Eine FAD wird nicht durch einen einzigen Flohstich ausgelöst**
- Auch bei Feldresistenzen anderer Wirkstoffe aktiv
- Sofortige, lang anhaltende Wirkung über 12 Wochen auch bei heimischen Zecken*
- Ausgezeichnete Verträglichkeit (1,6 % milde, vorübergehende gastrointestinale Effekte)
- Trächtige und säugende Hündinnen, Zuchttiere
- MDR1 -/- : gut verträglich
- Welpen ab 8 Wochen, ab 2 kg KGW

BRAVECTO®

**1 Mal
=
12 Wochen**



Bravecto®

Gewichtsklasse	mg	Laufzeit	Listenpreis in Euro	ab Menge	Rabatt auf einzelne HF	Aktionspreis in Euro
XS (1x1 Tablette) (2,0-4,5 kg)	112,5 mg	10/2015	12,55 €	ab 5 Pck ab 10 Pck	5 % 10 %	11,92 € 11,30 €
S (1x1 Tablette) (> 4,5- 10,0 kg)	250,0 mg	02/2016	14,10 €	ab 5 Pck ab 10 Pck	5 % 10 %	13,40 € 12,69 €
M (1x1 Tablette) (> 10,0- 20,0 kg)	500,0 mg	11/2015	16,50 €	ab 5 Pck ab 10 Pck	5 % 10 %	15,68 € 14,85 €
L (1x1 Tablette) (> 20,0- 40,0 kg)	1000,0 mg	01/2016	19,75 €	ab 5 Pck ab 10 Pck	5 % 10 %	18,76 € 17,78 €
XL (1x1 Tablette) (> 40,0- 56,0 kg)	1400,0 mg	01/2016	21,25 €	ab 5 Pck ab 10 Pck	5 % 10 %	20,19 € 19,13 €

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.bravecto.de
parasitesandvectors.com/series/bravecto



* **Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Kautabletten** für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. **Wirkstoff:** Fluralaner. **Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält: 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* und *D. variabilis* über 12 Wochen, sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Rhipicephalus sanguineus* über 8 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Die Wirkung beginnt bei Flöhen (*C. felis*) innerhalb von 8 Stunden, bei Zecken (*I. ricinus*) innerhalb von 12 Stunden nach Anhaftung. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** In klinischen Studien häufig beobachtete Nebenwirkungen (bei 1,6 % der behandelten Hunde) waren milde und vorübergehende gastrointestinale Effekte wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter Speichelfluss. **Handelsformen:** Faltschachtel mit 1 Kautablette im Blister. **Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer:** Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim.

** Dryden, M.W., „Floh- und Zeckenkontrolle im 21. Jahrhundert: Herausforderungen und Chancen“, Veterinary Dermatologie (2009), 20: 435-440.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere™
 Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit
 Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.zecken-und-flohfrei.de | www.msd-tiergesundheit.de

 **MSD**
 Tiergesundheit