



BRAVECTO[®]

PORTFOLIO

Für Hunde und Katzen



ZWÖLF WOCHEN^{*}
SCHUTZ



Für einen ganzjährigen Schutz gegen Zecken und Flöhe

MEHR. WERT.
PRÄVENTION.



MSD
Tiergesundheit

Freie Wahl für die passende Lösung!



HUND

Fluralaner



Zeckenschutz*



Flohschutz*



Demodikose-
Behandlung



Sarcoptes-
Behandlung

- Ab 8 Wochen und 2 kg Körpergewicht
- Zugelassen für die Anwendung bei trächtigen & säugenden Hündinnen und bei Zuchttieren
- Anwendung bei MDR1-Defekt¹



BRAVECTO® Spot-on

Die systemische Alternative
mit der Easy-to-give Pipette

BRAVECTO® Kautablette

Über 90 %ige freiwillige Akzeptanz²

Als 2er-Packung erhältlich



Unser Hundekuchen,
der schmeckt & schützt!



KATZE

Spot-ons sind unter Katzenhaltern das am meisten verwendete Antiparasitikum³

BRAVECTO® Spot-on

Ab 9 Wochen und 1,2 kg Körpergewicht
Gewichtsklasse M als 2er-Packung erhältlich



Fluralaner



Zeckenschutz*



Flohschutz*



Ohrmilben-
Behandlung

Moxidectin + Fluralaner



BRAVECTO® PLUS

Spot-on

Die Endekto-Kombilösung:
12 Wochen Schutz gegen Zecken
und Flöhe mit Wurmwirkung*

Ab 9 Wochen und 1,2 kg Körpergewicht
Gewichtsklasse M als 2er-Packung erhältlich



Spulwurm-
behandlung
(*Toxocara cati*)



Hakenwurm-
behandlung
(*Ancylostoma
tubaeforme*)



Prävention
von Herzwurm-
erkrankungen
(*Dirofilaria immitis*)

BRAVECTO® ist in folgenden Handelsformen erhältlich:

Farbskala der Verpackungen



BRAVECTO® Kautablette und Spot-on



Gewicht in kg


Alle Gewichtsklassen auch als
2er-Packung erhältlich



BRAVECTO® Spot-on

Gewichtsklasse **M**
auch als 2er-Packung
erhältlich


Gewicht in kg



BRAVECTO® PLUS Spot-on

Gewichtsklasse **M**
auch als 2er-Packung
erhältlich

Gewicht in kg



BRAVECTO®

✓ Gewährleistung einer langanhaltenden Parasitenkontrolle durch

12 ZWÖLF WOCHEN*
SCHUTZ

✓ Ganzjährige Anwendung möglich

✓ Lückenlose Anwendung verringert Risiko späterer Kosten[#]

✓ Einfache Handhabung

✓ Über 170 klinische Studien

Über **175 Mio.** Dosen^{##}
in **90** Ländern verkauft

* Entstehende Kosten durch Behandlung von durch Zecken übertragenen Erkrankungen.

** Kautabletten und Spot-on

Referenzen: 1. Fachinformation Bravecto® Kautablette, Bravecto® Spot-on Hund 2. Meadows C et al. A randomized, blinded, controlled USA field study to assess the use of fluralaner tablets in controlling canine flea infestations. Parasites & Vectors. 2014;7:375. 3. Studie Biosat Ecto 2019.

* **Bravecto® Kautabletten:** sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* und *D. variabilis* über 12 Wochen, sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Rhipicephalus sanguineus* über 8 Wochen. Zur Behandlung der durch *Demodex canis* verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*) Befalls. **Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde:** sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis* und *Ctenocephalides canis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* und *Dermacentor reticulatus* über 12 Wochen. Zur Behandlung der durch *Demodex canis* verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*) Befalls. **Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen:** sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (*Otodectes cynotis*). **Bravecto® Plus Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen:** sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (*Otodectes cynotis*). Zur Behandlung von Infektionen mit Spulwürmern (*Toxocara cati*) und Hakenwürmern (*Ancylostoma tubaeforme*). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel kontinuierlich einer durch *Dirofilaria immitis* verursachten Herzwurmerkrankung vor.

Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Kautabletten für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. **Wirkstoff:** Fluralaner. **Wirkstoffgruppe:** Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. **Zusammensetzung:** 1 Kautablette enthält: 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Schweineleberaroma, Saccharose, Maisstärke, Natriumdodecylsulfat, Dinatriummonbonat-Monohydrat, Magnesiumstearat, Aspartam, Glycerol, Sojabohnenöl, Macrogol 3350. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* und *D. variabilis* über 12 Wochen sowie eine sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Rhipicephalus sanguineus* über 8 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Die Wirkung beginnt bei Flöhen (*C. felis*) innerhalb von 8 Stunden, bei Zecken (*I. ricinus*) innerhalb von 12 Stunden nach Anheftung. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung der durch *Demodex canis* verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*) Befalls. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Milde und vorübergehende gastrointestinale Symptome wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter Speichelfluss wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,6 % der behandelten Hunde). In sehr seltenen Fällen wurde in Spontanmeldungen von Krämpfen und Lethargie berichtet. **Handelsformen:** Faltschachtel mit 1 oder 2 Kautabletten im Blister.

Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. **Wirkstoff:** Fluralaner. **Wirkstoffgruppe:** Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. **Zusammensetzung:** 1 ml enthält 280 mg Fluralaner. 1 Pipette enthält 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis* und *Ctenocephalides canis*) über 12 Wochen und eine sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* und *Dermacentor reticulatus* über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung der durch *Demodex canis* verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*) Befalls. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen oder Haarausfall an der Applikationsstelle, wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,2 % der behandelten Hunde). **Warnhinweise:** Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. **Handelsformen:** Schachtel mit Ein-Dosen-Pipette.

Bravecto® 112,5/250/500 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine/mittelgroße/große Katzen. **Wirkstoff:** Fluralaner. **Wirkstoffgruppe:** Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. **Zusammensetzung:** 1 ml enthält 280 mg Fluralaner. 1 Pipette enthält 112,5/250/500 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (*Otodectes cynotis*). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen, Juckreiz oder Haarausfall an der Applikationsstelle wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (2,2 % der behandelten Katzen). Folgende weitere Symptome wurden kurz nach der Verabreichung gelegentlich beobachtet: Teilnahmslosigkeit/Tremor/Appetitlosigkeit (0,9 % der behandelten Katzen) oder Erbrechen/Speicheln (0,4 % der behandelten Katzen). **Warnhinweise:** Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. **Handelsformen:** Schachtel mit Ein-Dosen-Pipette.

Bravecto® Plus 112,5 mg/5,6 mg, 250 mg/12,5 mg, 500 mg/25 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine/mittelgroße/große Katzen. **Wirkstoffgruppe:** Antiparasitika, Insektizide und Repellentien, Endektozide, Milbemicine. **Zusammensetzung:** 1 Pipette enthält: 112,5/250/500 mg Fluralaner, 5,6/12,5/25 mg Moxidectin. Sonstige Bestandteile: Butylhydroxytoluol, Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid (DEET), Aceton. **Anwendungsgebiete:** Für Katzen mit bestehender parasitärer Mischinfektion durch Zecken oder Flöhe und Ohrmilben, gastrointestinale Nematoden oder Herzwürmer oder bei Vorliegen eines entsprechenden Gefährdungspotentials. Das Tierarzneimittel ist nur angezeigt, wenn eine gleichzeitige Anwendung gegen Zecken oder Flöhe und gegen einen oder mehrere der anderen Zielparasiten erforderlich ist. Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen mit sofortiger und anhaltender abtötender Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (*Otodectes cynotis*). Zur Behandlung von Infektionen mit intestinalen Spulwürmern (4. Larvalstadium, unreife adulte und adulte Stadien von *Toxocara cati*) und Hakenwürmern (4. Larvalstadium, unreife adulte und adulte Stadien von *Ancylostoma tubaeforme*). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel kontinuierlich einer durch *Dirofilaria immitis* verursachten Herzwurmerkrankung vor. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** In klinischen Studien wurden häufig milde und vorübergehende Hautreaktionen an der Applikationsstelle (Haarausfall, schuppige Haut, Rötung und Juckreiz) beobachtet. Folgende weitere Nebenwirkungen wurden gelegentlich in klinischen Studien kurz nach der Verabreichung beobachtet: Atemnot nach Abblecken der Applikationsstelle, vermehrtes Speicheln, Erbrechen, Bluterbrechen, Durchfall, Teilnahmslosigkeit, erhöhte Körpertemperatur, erhöhte Atemfrequenz und Pupillenerweiterung. Tremor und Anorexie wurden sehr selten nach der Anwendung dieses Tierarzneimittels berichtet (Pharmakovigilanz). **Warnhinweise:** Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. **Handelsformen:** Schachtel mit 1 Pipette.

DE: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheits.de
AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria-Codex-Fachinformation“ zu entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | 1210 Wien | www.msd-tiergesundheits.at
© 2021 Intervet International BV., also known as MSD Animal Health. All rights reserved.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheits.de
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | 1210 Wien | www.msd-tiergesundheits.at
AT-BRV-210300001

BRAVECTO®

BRAVECTO®
PLUS

 **MSD**
Tiergesundheit