# IMPFUNGEN IN HOBBYBESTÄNDEN – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

## 1. Was muss ich impfen?

In Deutschland ist die Impfung gegen die **N**ewcastle **D**isease (**ND**, atypische Geflügelpest) vorgeschrieben.
Jedes Huhn und jede Pute muss geimpft werden (ab Bestandsgröße von **1 Tier**!). Alle anderen Impfungen sind in Hobbybeständen zwar unter Umständen sinnvoll, aber nicht verpflichtend.

## 2. Welche ND-Impfstoffe empfiehlt MSD und mit welchem Impfschema?

- **Lebendimpfstoffe** (Grundimmunisierung):
  - Nobilis® Ma5 + Clone 30 (auch in 1x 1.000 Dosen erhältlich)
  - Nobilis® ND Clone 30 (ab 10x 1.000 Dosen)

- **Inaktivatimpfstoffe** (Boosterung):
  - Nobilis® IB + ND (1x 1.000 Dosen)
  - Nobilis® Newcavac (1x 1.000 Dosen, reiner ND-Impfstoff)

- **Impfschema:**
  2x Impfung mit Lebendimpfstoff im Abstand von 6 Wochen, gefolgt von einer Inaktivatimpfung 6 Wochen später. Mit diesem Impfschema kann ein Impfschutz von **1 Jahr** erreicht werden.

## 3. Wie werden die Impfstoffe angewendet?

**Lebendimpfstoffe – Impfung ab 1. Lebenstag möglich:**

a. Trinkwasser/oral: 1.000 Dosen Impfstoff in bspw. 1 Liter Wasser auflösen **(1 Dosis = 1 ml)**. Nach **Anbruch des Impfstoffbehältnisses** ist der Impfstoff noch **2 Stunden** haltbar. In dieser Zeit sollte der Impfstoff von den Tieren getrunken werden (Anbieten in einer kleinen Menge Wasser, Tiere vorher ca. 2 Stunden dursten lassen. Alternativ Impfstofflösung jedem Huhn direkt oral eingeben).

b. Oculo-nasal (zusätzlich bestellen **Diluent Oculo-nasal, für 1.000 Impfstoffdosen → 35 ml**): Impfstoff mit Hilfe des Adapters im Lösungsmittel Diluent Oculo-nasal auflösen. Jedem Huhn 1 Tropfen in ein Auge oder Nasenloch geben **(1 Tier = 1 Tropfen)**.

**Inaktivatimpfstoffe (Impfung ab ca. 16. Lebenswoche):**

0,5 ml des Impfstoffs (vorher auf Raumtemperatur bringen) **subkutan** (Hautfalte, wie bei Tauben) oder intramuskulär in den Brustmuskel. Sollten Sie nicht häufig Vögel intramuskulär spritzen, empfehlen wir die subkutane Impfung. Bei einer fehlerhaften intramuskulären Impftechnik kann es zur Leber- oder Herzperforation kommen und zu Todesfällen bei den Impflingen.

MEHR.WERT.
VERANTWORTUNG.

MSD
Tiergesundheit

# IMPFUNGEN IN HOBBYBESTÄNDEN – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

## 4. Welche Möglichkeiten bestehen zur Impfung gegen die Marek’sche Erkrankung?

Gegen die Marek’sche Erkrankung bietet MSD Tiergesundheit ein breites Impfstoffsortiment an (Nobilis® Rismavac, Rismavac + CA126, Innovax®).

Bitte beachten Sie: Impfstoffe gegen die Marek’sche Erkrankung sind stickstoffgekühlt. Aufgrund des großen logistischen Aufwands sind **Bestellungen erst ab 20.000 Dosen** möglich, zuzüglich eines Versandkosten-Aufschlags. Ab 50.000 Dosen ist die Lieferung versandkostenfrei.

## 5. Welche Möglichkeiten bestehen zur Impfung gegen Kokzidien?

MSD-Tiergesundheit bietet mit Paracox® 8 den perfekten Impfstoff für Hobbyhühner. Beachten Sie, dass die Einstreu nach der Impfung 4 Wochen lang nicht gewechselt werden sollte und keine Kokzidiostatika im Futter enthalten sein dürfen.

## 6. Wo finde ich weitere Informationen und Anleitungen zu Impftechniken?

Wichtige Informationen finden Sie auf
**www.msd-tiergesundheit.de/tierarten/gefluegel**
und ATF-Fortbildungen unter
**www.msd-tiergesundheit.de/fortbildungsplattform**

Sollten Sie weitere Fragen haben, finden Sie den passenden Ansprechpartner auf
**www.msd-tiergesundheit.de/ueber-uns/ansprechpartner**
oder schicken Sie uns eine E-Mail an
**info.gefluegelundfisch@msd.de**

**Ihr Geflügelteam der MSD Tiergesundheit**

Urheberrechtlich geschützt © 2021 Intervet International B.V., ein Tochterunternehmen der Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Alle Rechte vorbehalten.
**Die Wissenschaft für gesündere Tiere**
Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit
Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | **www.msd-tiergesundheit.de**
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | **www.msd-tiergesundheit.at**

MEHR.WERT.
VERANTWORTUNG.

MSD
Tiergesundheit