



Nobivac 
Protection unites us.

Individuell schützen – punktgenau impfen

NOBIVAC®-IMPFSTOFF-PORTFOLIO



**MEHR. WERT.
PRÄVENTION.**



MSD
Tiergesundheit

NOBIVAC®-IMPfstoff-PORTFOLIO

● Hund ● Katze ● Kaninchen

	IMPFBEGINN (ab Lebensalter) regulär / Frühimmunisierung	DAUER DER IMMUNITÄT nach Grundimmunisierung
 Nobivac® DP PLUS*	4 Wochen	8 Wochen
 Nobivac® SHP	8 Wochen	3 Jahre
 Nobivac® SHPPi	8 Wochen	3 Jahre Staupe, Hepatitis, Parvovirose 1 Jahr Parainfluenza
 Nobivac® L4	8 Wochen / 6 Wochen	1 Jahr
 Nobivac® Respira Bb*	8 Wochen / 6 Wochen	1 Jahr***
 Nobivac® BbPi*	8 Wochen / 3 Wochen	1 Jahr
 Nobivac® Pi	8 Wochen	1 Jahr
 Nobivac® T	12 Wochen	3 Jahre
 Nobivac® RC	8 Wochen / 6 Wochen	1 Jahr
 Nobivac® RCP	8–9 Wochen	1 Jahr FCV, FHV / 3 Jahre FPLV
 Nobivac® Bb*	8 Wochen / 1 Monat	1 Jahr
 Nobivac® Myxo-RHD PLUS*	7 Wochen / 5 Wochen**	1 Jahr

* exklusiv bei MSD Tiergesundheit

** wenn keine maternalen Antikörper vorhanden sind

*** Eine Impfung 7 Monate nach der Grundimmunisierung mit diesem Impfstoff ist für einen Schutz gegen *Bordetella bronchiseptica* für ein weiteres Jahr ausreichend. Danach sollten Impfungen jährlich erfolgen. Sollte die Wiederholungsimpfung nach 7 Monaten versäumt worden sein, ist eine Impfung innerhalb von 12 Monaten für einen Schutz gegen *Bordetella bronchiseptica* für ein weiteres Jahr ausreichend.

ERWEITERTES IMPfstoff-PORTFOLIO FÜR HUNDE VON MSD TIERGESUNDHEIT:

LetiFend®, die innovative Impfstofftechnologie zur Leishmaniose-Prophylaxe

	ERSTIMPFUNG	EINTRITT IMMUNITÄT	DAUER DER IMMUNITÄT
LetiFend®	ab einem Lebensalter von 6 Monaten	nach 28 Tagen	1 Jahr

IMPFSHEMA HUND

OPTION 1

ausschließlich Nobivac® Respira Bb

	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung			
	8 Wochen	12 Wochen	Auffrischung	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
 Nobivac® SHPPi						
 Nobivac® L4			 nach 12 Monaten			
 Nobivac® Pi			 nach 12 Monaten			
 Nobivac® Respira Bb			 nach 7 Monaten			
 Nobivac® T						

A Bei der Verwendung von Nobivac® Respira Bb wird die gleichzeitige Gabe von Nobivac® SHPPi oder Nobivac® Pi empfohlen.

B Nobivac® Respira Bb kann bereits ab einem Alter von 6 Wochen geimpft werden.

C Eine einfache Impfung 7 Monate nach der Grundimmunisierung mit Nobivac® Respira Bb ist ausreichend, um den Schutz gegen Bb für ein weiteres Jahr aufrecht zu erhalten. Danach sollte die einfache Impfung jährlich erfolgen. Sollte die Auffrischung nach 7 Monaten versäumt werden, ist eine einfache Impfung 12 Monate nach der Grundimmunisierung ausreichend, um den Schutz gegen Bb für ein weiteres Jahr zu verlängern.

D Es liegen keine Informationen zur Unschädlichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei gleichzeitiger Anwendung von Nobivac® T und Nobivac® Respira Bb vor. Ob der Impfstoff vor oder nach Verabreichung eines anderen Tierarzneimittels angewendet werden sollte, muss daher von Fall zu Fall entschieden werden.

OPTION 2

ausschließlich Nobivac® BbPi

	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung			
	8 Wochen	12 Wochen	nach 12 Monaten	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
 Nobivac® SHP						
 Nobivac® L4						
 Nobivac® BbPi						
 Nobivac® T						

A Nobivac® BbPi kann ab einem Alter von 3 Wochen angewendet werden.

OPTION 3

Erstimpfung mit Nobivac® BbPi und anschließend Nobivac® Respira Bb

	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung			
	8 Wochen	12 Wochen	nach 12 Monaten	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
 Nobivac® SHPPi						
 Nobivac® SHP						
 Nobivac® L4						
 Nobivac® Pi						
 Nobivac® BbPi						
 Nobivac® Respira Bb						
 Nobivac® T						

BEI ALLEN DREI OPTIONEN

optionale Frühimmunisierung mit Nobivac® DP PLUS

 Nobivac® DP PLUS	Frühimmunisierung: ab 4 Wochen	Dauer der Immunität: 8 Wochen
--	---------------------------------------	--------------------------------------

A Nobivac® BbPi kann ab einem Alter von 3 Wochen angewendet werden.

B Es liegen keine Informationen zur Unschädlichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei gleichzeitiger Anwendung von Nobivac® T und Nobivac® Respira Bb vor. Ob der Impfstoff vor oder nach Verabreichung eines anderen Tierarzneimittels angewendet werden sollte, muss daher von Fall zu Fall entschieden werden.

Für die Komponenten **Staupe** und **Parvovirose** empfiehlt die **StIKo Vet** weitere Impfungen zur Grundimmunisierung mit 16 Lebenswochen und 15 Lebensmonaten (StIKo Vet am FLI | Stand 01.01.2021).

IMPFSHEMA KATZE

	Frühimmunisierung		Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung	
	1 Monat	6 Wochen	8 (-9) Wochen	12 Wochen (3-4 Wochen nach Erstimpfung)	jährlich	alle 3 Jahre
Nobivac® Bb						
Nobivac® RC						
Nobivac® RCP						
Nobivac® T						

A Es liegen keine Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei gleichzeitiger Anwendung eines anderen immunologischen Tierarzneimittels vor. Ob der Impfstoff vor oder nach Verabreichung eines anderen immunologischen Tierarzneimittels verwendet werden sollte, muss daher fallweise entschieden werden.

B Eine Impfung in einem Alter von 6 Wochen hat sich als sicher erwiesen.

C Bei Welpen ohne Frühimmunisierung

Für die Komponenten FHV (R), FCV (C), Panleukopenie (P) empfiehlt die StIKo Vet weitere Impfungen zur Grundimmunisierung mit 16 Lebenswochen und 15 Lebensmonaten (StIKo Vet am FLI | Stand 01.01.2021).

IMPFSHEMA KANINCHEN

	Erstimpfung	Wiederholungsimpfung
Krankheiten	ab 5-7 Wochen (je nach Impfstatus des Muttertieres)*	jährlich
Myxomatose	 Nobivac® Myxo-RHD PLUS	 Nobivac® Myxo-RHD PLUS
RHD1 und RHD2		

* bei mit anderen Impfstoffen und Kombinationen vorgeimpften Kaninchen spezielles Umstellungsschema beachten

IMPFSHEMA LETIFEND® – LEISHMANIOSE-IMPfstOFF FÜR DEN HUND*

	Grundimmunisierung	Wiederholungsimpfung
LetiFend®	 Eine Impfung ab einem Alter von 6 Monaten	 jährlich

* nur nicht infizierte Tiere impfen

Weitere Produktinformationen finden Sie hier:



Nobivac® Bb



Nobivac® BbPi



Nobivac® DP PLUS



Nobivac® L4



Nobivac® Myxo-RHD Plus



Nobivac® Pi



Nobivac® Respira Bb



Nobivac® RC



Nobivac® RCP



Nobivac® SHP



Nobivac® SHPPi



Nobivac® T



Letifend®

Für medizinische Fragen rund um unsere Produkte steht Ihnen unsere tiermedizinische Fachberatung zur Verfügung:



**TIERMEDIZINISCHE
FACHBERATUNG**

089 456 143 43

Mo-Do: 9.00-17.00, Fr: 9.00-15.00

vethotline@msd.de