

# IMPFSHEMA KATZE



	Frühimmunisierung		Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung	
	1 Monat	6 Wochen	8 (-9) Wochen	12 Wochen (2-4 Wochen nach Erstimpfung)	jährlich	alle 3 Jahre
<b>Nobivac® Bb</b>						
<b>Nobivac® RC</b>						
<b>Nobivac® RCP</b>						
<b>Nobivac® T</b>						

**A** Es liegen keine Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei gleichzeitiger Anwendung eines anderen immunologischen Tierarzneimittels vor. Ob der Impfstoff vor oder nach Verabreichung eines anderen immunologischen Tierarzneimittels verwendet werden sollte, muss daher fallweise entschieden werden.  
**B** Eine Impfung in einem Alter von 6 Wochen hat sich als sicher erwiesen.  
**C** Bei Welpen ohne Frühimmunisierung

Für die Komponenten FHV (R), FCV (C), Panleukopenie (P) empfiehlt die SHKo Vet weitere Impfungen zur Grundimmunisierung mit 16 Lebenswochen und 15 Lebensmonaten (SHKo Vet am FLI | Stand 01.01.2021).

# IMPFSHEMA KANINCHEN

Krankheiten	Erstimpfung	Wiederholungsimpfung
	ab 5-7 Wochen (je nach Impfstatus des Muttertieres)*	jährlich
<b>Myxomatose</b>	Nobivac® Myxo-RHD PLUS	Nobivac® Myxo-RHD PLUS
<b>RHD1 und RHD2</b>		

\* bei mit anderen Impfstoffen und Kombinationen vorgeimpften Kaninchen spezielles Umstellungsschema beachten

# IMPFSHEMA LETIFEND® – LEISHMANIOSE-IMPfstOFF FÜR DEN HUND\*

	Grundimmunisierung	Wiederholungsimpfung
<b>LetiFend®</b>	Eine Impfung ab einem Alter von 6 Monaten	jährlich


\* nur nicht infizierte Tiere impfen




Weitere Produktinformationen finden Sie hier:




Nobivac® Bb




Nobivac® BbPi




Nobivac® DP PLUS




Nobivac® L4



Nobivac® Myxo-RHD Plus




Nobivac® Pi




Nobivac® Respira Bb




Nobivac® RC



Nobivac® RCP




Nobivac® SHP



Nobivac® SHPPi



Nobivac® T



Letifend®

Für medizinische Fragen rund um unsere Produkte steht Ihnen unsere tiermedizinische Fachberatung zur Verfügung:

**TIERMEDIZINISCHE  
FACHBERATUNG**

**089 456 143 43**

Mo-Do: 9.00-17.00, Fr: 9.00-15.00

[vethotline@msd.de](mailto:vethotline@msd.de)

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere  
 Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit  
 Intervet Deutschland GmbH · Feldstraße 1a · D-85716 Unterschleißheim · www.msd-tiergesundheit.de



11708-DE-Sept2022(500)DE-NOV-220800004



## Individuell schützen – punktgenau impfen

### NOBIVAC®-IMPfstOFF-PORTFOLIO

MEHR. WERT.  
PRÄVENTION.



# NOBIVAC®-IMPfstoff-PORTFOLIO

● Hund ● Katze ● Kaninchen

**Nobivac**   
Protection unites us.



## IMPFSHEMA HUND

**Nobivac**   
Protection unites us.

	IMPFBEGINN (ab Lebensalter) regulär / Frühimmunisierung	DAUER DER IMMUNITÄT nach Grundimmunisierung
<b>Nobivac® DP PLUS*</b>	4 Wochen	8 Wochen
<b>Nobivac® SHP</b>	8 Wochen	3 Jahre
<b>Nobivac® SHPPi</b>	8 Wochen	3 Jahre Staupe, Hepatitis, Parvovirose 1 Jahr Parainfluenza
<b>Nobivac® L4</b>	8 Wochen / 6 Wochen	1 Jahr
<b>Nobivac® Respira Bb*</b>	8 Wochen / 6 Wochen	1 Jahr***
<b>Nobivac® BbPi*</b>	8 Wochen / 3 Wochen	1 Jahr
<b>Nobivac® Pi</b>	8 Wochen	1 Jahr
<b>Nobivac® T</b>	12 Wochen	3 Jahre
<b>Nobivac® RC</b>	8 Wochen / 6 Wochen	1 Jahr
<b>Nobivac® RCP</b>	8–9 Wochen	1 Jahr FCV, FHV / 3 Jahre FPLV
<b>Nobivac® Bb*</b>	8 Wochen / 1 Monat	1 Jahr
<b>Nobivac® Myxo-RHD PLUS*</b>	7 Wochen / 5 Wochen**	1 Jahr

\* exklusiv bei MSD Tiergesundheit  
 \*\* wenn keine maternalen Antikörper vorhanden sind  
 \*\*\* Eine Impfung 7 Monate nach der Grundimmunisierung mit diesem Impfstoff ist für einen Schutz gegen *Bordetella bronchiseptica* für ein weiteres Jahr ausreichend. Danach sollten Impfungen jährlich erfolgen.  
 Sollte die Wiederholungsimpfung nach 7 Monaten versäumt worden sein, ist eine Impfung innerhalb von 12 Monaten für einen Schutz gegen *Bordetella bronchiseptica* für ein weiteres Jahr ausreichend.

**OPTION 1**  
ausschließlich Nobivac® Respira Bb

	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung			
	8 Wochen	12 Wochen	Auffrischung	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
<b>Nobivac® SHPPi</b> <sup>A</sup>						
<b>Nobivac® L4</b>			nach 12 Monaten			
<b>Nobivac® Pi</b>			nach 12 Monaten			
<b>Nobivac® Respira Bb</b> <sup>B</sup>			nach 7 Monaten <sup>C</sup>			
<b>Nobivac® T</b>		<sup>D</sup>			<sup>D</sup>	

<sup>A</sup> Bei der Verwendung von Nobivac® Respira Bb wird die gleichzeitige Gabe von Nobivac® SHPPi oder Nobivac® Pi empfohlen.  
<sup>B</sup> Nobivac® Respira Bb kann bereits ab einem Alter von 6 Wochen geimpft werden.  
<sup>C</sup> Eine einfache Impfung 7 Monate nach der Grundimmunisierung mit Nobivac® Respira Bb ist ausreichend, um den Schutz gegen Bb für ein weiteres Jahr aufrecht zu erhalten. Danach sollte die einfache Impfung jährlich erfolgen. Sollte die Auffrischung nach 7 Monaten versäumt werden, ist eine einfache Impfung 12 Monate nach der Grundimmunisierung ausreichend, um den Schutz gegen Bb für ein weiteres Jahr zu verlängern.  
<sup>D</sup> Es liegen keine Informationen zur Unschädlichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei gleichzeitiger Anwendung von Nobivac® T und Nobivac® Respira Bb vor. Ob der Impfstoff vor oder nach Verabreichung eines anderen Tierarzneimittels angewendet werden sollte, muss daher von Fall zu Fall entschieden werden.

**OPTION 2**  
ausschließlich Nobivac® BbPi

	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung			
	8 Wochen	12 Wochen	nach 12 Monaten	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
<b>Nobivac® SHP</b>						
<b>Nobivac® L4</b>						
<b>Nobivac® BbPi</b> <sup>A</sup>						
<b>Nobivac® T</b>						

<sup>A</sup> Nobivac® BbPi kann ab einem Alter von 3 Wochen angewendet werden.

**OPTION 3**  
Erstimpfung mit Nobivac® BbPi und anschließend Nobivac® Respira Bb

	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung			
	8 Wochen	12 Wochen	nach 12 Monaten	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
<b>Nobivac® SHPPi</b>						
<b>Nobivac® SHP</b>						
<b>Nobivac® L4</b>						
<b>Nobivac® Pi</b>						
<b>Nobivac® BbPi</b> <sup>A</sup>						
<b>Nobivac® Respira Bb</b>						
<b>Nobivac® T</b>					<sup>B</sup>	

**BEI ALLEN DREI OPTIONEN**  
 optionale Frühimmunisierung mit Nobivac® DP PLUS

<b>Nobivac® DP PLUS</b>	Frühimmunisierung: ab 4 Wochen	Dauer der Immunität: 8 Wochen
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------

<sup>A</sup> Nobivac® BbPi kann ab einem Alter von 3 Wochen angewendet werden.  
<sup>B</sup> Es liegen keine Informationen zur Unschädlichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei gleichzeitiger Anwendung von Nobivac® T und Nobivac® Respira Bb vor. Ob der Impfstoff vor oder nach Verabreichung eines anderen Tierarzneimittels angewendet werden sollte, muss daher von Fall zu Fall entschieden werden.

Für die Komponenten Staupe und Parvovirose empfiehlt die SHKo Vet weitere Impfungen zur Grundimmunisierung mit 16 Lebenswochen und 15 Lebensmonaten (SHKo Vet am FLI | Stand 01.01.2021).

### ERWEITERTES IMPfstoff-PORTFOLIO FÜR HUNDE VON MSD TIERGESUNDHEIT: LetiFend®, die innovative Impfstofftechnologie zur Leishmaniose-Prophylaxe

	ERSTIMPfung	EINTRITT IMMUNITÄT	DAUER DER IMMUNITÄT
<b>LetiFend</b>	ab einem Lebensalter von 6 Monaten	nach 28 Tagen	1 Jahr