

Годування молозивом – «5 принципів»: забезпечити новонародженому теляті якомога більше антитіл



Протягом
2 годин

1. Велика швидкість: дати молозиво якомога швидше!


- Погодувати теля одразу після народження, але **не пізніше ніж через 2 години** після народження високоякісним молозивом, **видосним в умовах чистоти**.



Принаймні
3–4 літри


2. Вагома кількість: якомога більше та якомога довше годувати молозивом!

- Протягом **перших 2 годин** після народження давати **3 – 4 літри** молозива, а потім через 10 годин погодувати ще 2 – 3 літрами. **Обмежень по кількості не існує**, поки теля добровільно п'є молозиво.
- Годування протягом **більш тривалого часу** молозивом та перехідним молоком **позитивно впливає на здоров'я** теляти, захищає його систему травлення та сприяє його розвитку.



3. Висока якість: молозиво якомога вищої якості!

- > 50 г антитіл** на літр молозива, показання рефрактометра зі шкалою Брікс: **> 22 %**.¹
- Перевірка **вмісту антитіл** за допомогою рефрактометра зі шкалою Брікс:
 - Внести **1 – 2 краплі** молозива на **вимірювальну пластину**. Після цього обережно закрити кришку. Вимірювальна пластина повинна бути повністю покритою без бульбашок.
 - Зчитати показник зі шкали Брікс**. Під час дослідження молозива лінія вимірювання може бути нечіткою.
 - Ретельне очищення** вимірювальної пластини після кожного заміру.
- Зробити запаси молозива**: надлишки високоякісного молозива потрібно негайно заморозити, можна зберігати в морозильній камері (-20 °C) не більше 1 року. **Увага**: при розморожуванні та нагріванні молозива його температура не повинна перевищувати 40 °C.



4. Виняткова чистота: працюйте в якомога чистіших умовах!


- Дотримуйтеся гігієни доїння**: одягніть **рукавички**, здоїть 3 – 4 струмені з кожної дійки в **доїльний стакан**, протріть кінчик дійки чистою **серветкою для вим'я** (1 серветка на корову, 1 куток серветки на одну дійку), використовуйте лише **здорові долі вим'я** для доїння.
- Використовуйте виключно **очищений посуд для доїння та годування**.



5. Вимірювання: якомога більше антитіл!

- > 10 г антитіл** на літр сироватки, показання рефрактометра зі шкалою Брікс: **8,4 %**.²

Відео з додатковою інформацією



1. Biemann et al. 2010 2. Morin et al. 2021

БІЛЬШЕ.
ЗНАЧЕННЯ.
ПРОФІЛАКТИКИ.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit
Intervet Deutschland GmbH • Feldstr. 1a • 85716 Unterschleißheim • www.msd-tiergesundheit.de
Intervet GesmbH • Siemensstraße 107 • 1210 Wien • www.msd-tiergesundheit.at
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.



MSD
Tiergesundheit

DE-NOW-24080005